Vorlesung: Dr. Daniel Habeck

Übungen: David Willems

Download von Übungsblättern, Zusatzmaterial etc.: <http://uni-ko-ld.de/k7>**Aufgabe 3.1**

Sei $U \subset \mathbb{R}^n$ offen und $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion. Sei $x \in U$ und $f(x) = c$. Beweisen Sie, dass der Gradient $\text{grad } f(x)$ auf der Niveauläche $N_f(c) := \{z \in U: f(z) = c\}$ senkrecht steht, d. h. dass folgendes gilt: Ist $\varphi:]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $\varepsilon > 0$ eine beliebige stetig differenzierbare Kurve mit $\varphi(0) = x$ und $\varphi(] - \varepsilon, \varepsilon[) \subset N_f(c)$, so folgt $\langle \varphi'(0), \text{grad } f(x) \rangle = 0$.

Aufgabe 3.2

Bestimmen Sie den Gradienten von

a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 3x^3 + 3x^2y - y^3 - 15x,$

b) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) = e^{(x-1)^2 + (y-2)^2},$

c) $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(x, y, z) = x_1 \sqrt{x_2 - x_3^2} + x_2^2 \ln(x_3) - e^{x_1 x_2}.$

Aufgabe 3.3a) Berechnen Sie mit der Definition der Richtungsableitung für die Funktion $f(x, y) = x^2 + y^2$ die Richtungsableitung im Punkt $(0, 0)$ Richtung $v = (1, 1)$.

b) Berechnen Sie die Richtungsableitung von

1. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) := (x + z)^2 y + x \cos(\pi(y - z))$ im Punkt $(-1, 4, 2)$ in Richtung $(6, 5, 1)$.

2. $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x, y) := \begin{cases} \frac{x^3 + y^2}{x + y} & \text{für } x \neq -y \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$ im Punkt $(0, 0)$ in Richtung $v := (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.

Aufgabe 3.4Berechnen Sie die Gleichung der Tangentialebene zur Funktion $f(x, y) := x^4 + 2x^3y^2 + y$ im Punkt $(1, 1, f(1, 1))$.**Aufgabe 3.5**

Beweisen Sie den folgenden Satz:

SatzFür eine Abbildung $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sind folgende Aussagen äquivalent:a) φ ist eine lineare Abbildung.b) Es gibt eine $m \times n$ Matrix A mit $\varphi(h) = Ah$ für alle h in $\mathbb{R}^n$.

Aufgabe 3.6

Gegeben sei die Funktion $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x, y) = (x + y)e^{x^2 - y^2}$ und der Punkt $P = (0, 1)$. Bestimmen Sie die Gleichung der Tangentialebene an f im Punkt P .

Aufgabe 3.7

Eine Schraubenlinie in $\mathbb{R}^3$ hat die Parameterdarstellung

$$f: I \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(t) = (\cos(a \cdot t), \sin(a \cdot t), k \cdot t)^T$$

mit Konstanten $a, k \in \mathbb{R}$. Im folgenden sei $I = [0, 2\pi]$, $a = 4$ und $k = 3$.

- Berechnen Sie den Tangenteneinheitsvektor $T(t)$ für $t \in I$.
- Berechnen Sie den Normalenvektor $T'(t)$ im Punkt $f(t)$.
- Zeigen Sie, dass die Krümmung

$$k(t) = \frac{\|T'(t)\|}{\|f'(t)\|}$$

der Schraubenlinie konstant ist.

Aufgabe 3.8

Zeigen Sie, dass die Beziehung

$$\text{grad}(fg) = g \text{ grad } f + f \text{ grad } g$$

für partiell differenzierbare Funktionen $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gilt.